

Другим найбільш поширеним захворюванням виявилася катаракта: по загальній захворюваності ока у 2017 році зареєстровано 109062 звернень з приводу катаракти у дорослого населення, що надавало показник 133,0 на 100 тис. населення (10,4%) та в порівнянні з показником 2015 року - 292,6 на 100 тис. населення (9,6%), звертає на себе увагу зростання звернень хворих на цю патологію протягом трьох років. Глаукома у дорослого населення в загальній захворюваності зустрічалася з частотою 51,5 на 100 тис. населення (4,4%) у 2017 році та у 2015 р. - 51,7 на 100 тис. населення (4,4%), з чого можна зробити висновок про незмінність показника за трирічний період. Захворюваність на діабетичну катаракту у 2017 р. склала 9,8 на 100 тис. населення, що на 0,5 % більше ніж у 2015 році (9,5 на 100 тис. населення).

Також необхідно відзначити, що у 2017 р. загальна захворюваність дорослого населення на атрофію зорового нерву і відшарування та розрив сітківки знизилася на 4,6% і 0,9% відповідно в порівнянні з 2015 роком, а на діабетичну ретинопатію збільшилася на 2,6%. Загальна захворюваність на глаукому протягом трьох років стійко зберегла показник в межах 5,7 на 100 тис. населення, що складало 1,7 % від всієї очної патології.

Висновки. Хвороби ока і його придаткового апарату продовжують залишатися однією з актуальних медико-соціальних проблем. Тому отримані результати є відображенням впровадження сучасних методів діагностики на амбулаторному рівні в зв'язку зі змінами по організації первинної медико-санітарної допомоги та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

Morbidity of the adult population of Ukraine on eye and its appendage apparatus diseases for 2015-2017.

Myrnenko V. V., Berezovska K. O., Korniienko A. P., Volkova Yu. C.

SI «The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» (Odesa, Ukraine)

The analysis of the morbidity of eye and its appendage disease among the adult population of Ukraine in the dynamics for 2015-2017 was conducted. It was noted that in 2017 in the structure of the primary and general morbidity of the adult population with eye and its appendage diseases, the most common diseases were conjunctivitis and other conjunctival diseases (30.7%). The second most common disease was cataract (10.4%). Third place was myopia (5.9 %). The results are a reflection of the modern diagnostic methods at the outpatient level presentation due to changes in the organization of primary health care and secondary (specialized) medical care.

Порівняльний аналіз поширеності кон'юнктивіту та інших захворювань кон'юнктиви серед дорослого населення України за 2014 та 2017 рр.

Мирненко В. В., Корнієнко А. П., Березовська К. О., Волкова Ю. С.

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України» (Одеса, Україна)

Актуальність. На теперішній час у структурі поширеності хвороб ока та придаткового апарату, кон'юнктивіт та інші захворювання кон'юнктиви складають 12,2 % і стійко займають третє місце після катаракти і міопії. Серед звернень з приводу запальних захворювань очей, в 66,7% відзначаються хворі на кон'юнктивіт та інші захворювання кон'юнктиви. Найбільш поширений кон'юнктивіт бактеріальної і вірусної етіології, рідше зустрічаються алергічні та дистрофічні. В останні десятиліття відзначено збільшення кількості захворювання на алергічний кон'юнктивіт, який вражає близько 15% всього населення і став важливою клінічною проблемою практичної офтальмології.

Мета. Провести аналіз поширеності кон'юнктивіту та інших захворювань кон'юнктиви серед дорослого населення України за 2014 та 2017 рр.

Матеріал і методи. Вивчалися річні звіти з роботи офтальмологічної служби України за 2014 та 2017 рр. Проведено порівняльний аналіз звернень дорослого населення в офтальмологічні кабінети поліклінік та амбулаторій областей України на протязі 2014 та 2017 рр.

Результати. За наданими статистичними показниками в різних областях України кількість випадків захворювання на кон'юнктивіт значно варіює, що може бути обумовлено багатьма факторами, в тому числі несприятливою екологічною обстановкою, техногенними впливами, навантаженням на орган зору, яке зростає в сучасних умовах. Так, у 2014 та 2017 рр. на фоні зниження частоти реєстрації хвороб ока та придаткового апарату в цілому по Україні (2014 р. – 8120,0 на 100 тис. населення, 2017 р. – 8061,6 на 100 тис. населення), та при тенденції зменшення поширеності безпосередньо кон'юнктивіту та ін. захворювань кон'юнктиви (2014 р. – 1025,2 на 100 тис. населення, 2017 р. – 986,3 на 100 тис. населення) спостерігається зростання цієї патології на окремих адміністративних територіях: Житомирській (2014 р. – 652,8 на 100 тис. населення, 2017 р. – 678,7 на 100 тис. населення), Закарпатській (2014 р. – 1046,3, 2017 р. – 1158,0 на 100 тис. населення), Кіровоградській (2014 р. – 857,0 на 100 тис. населення, 2017 р. – 869,2 на 100 тис. населення), Сумській (2014 р. – 746,3 на 100 тис. населення, 2017 р. – 838,3), Тернопільській (2014 р. – 1336,8 на 100 тис. населення, 2017 р. – 1375,5 на 100 тис. населення), Чернівецькій (2014 р. – 1049,4 на 100 тис. населення, 2019 р. – 1084,5 на 100 тис. населення), Чернігівській (2014 р. – 1231,9 на 100 тис. населення, 2017 р. – 1380,7 на 100 тис. населення) областях.

Також за даними звернення дорослого населення працездатного віку до спеціалізованих офтальмологічних закладів областей України, у 2014 році поширеність кон'юнктивіту та ін. захворювань кон'юнктиви в середньому склала 991,1 на 100 тис. населення. Відповідно даним за 2017 рік, поширеність цієї патології в середньому вже становила – 963,6 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень поширеності кон'юнктивіту та ін. захворювань кон'юнктиви у дорослого населення працездатного віку в 2014 році зареєстрований в областях: Дніпропетровській – 1535,6 на 100 тис. населення, Івано-Франківській – 1508,6 на 100 тис. населення та Львівській області – 1499,1 на 100 тис. дорослого населення, що в порівнянні з 2017 році мало тенденцію до зниження на протязі останніх 4-х років. Найнижчий рівень у 2014 році спостерігався у Житомирській області – 539,4 на 100 тис. населення, але у 2017 році найнижчий ступінь поширеності вже відзначений у Луганській області – 447,4 на 100 тис. населення.

Висновки. Проведений аналіз даних за 2014 та 2017 рр. свідчить про зниження поширеності кон'юнктивіту та ін. захворювань кон'юнктиви серед дорослого населення України на 6,6%. Таким чином, наведені результати підкреслюють важливе значення оптимізації системи надання офтальмологічної допомоги, що сприяє покращенню стану здоров'я цього контингенту хворих.

A comparative analysis of the prevalence of conjunctivitis and other conjunctival diseases among the adult population of Ukraine in 2014 and 2017

Myrnenko V. V., Korniienko A. P., Berezovska K. O., Volkova Yu. S.

SI «The Filatov Institute of Eye Diseases and Tissue Therapy of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» (Odesa, Ukraine)

The disease of the conjunctiva is the most common pathology among the inflammatory diseases of the eye and accounts for about 30% of the total ocular pathology. The analysis of the prevalence of conjunctivitis and other conjunctival diseases among the adult population of Ukraine in 2014 and 2017 is carried out.